

ACC 200 mg, 25 sztuk, tabletki musujące



Cena: 23,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACC
Opakowanie	25 tabletek
Postać	Tabletka musująca
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	ACC
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis
ACC to lek medyczny, który pomaga rozrzedzić wydzielinę w drogach oddechowych, ułatwiając jej odkrztuszanie.

Wskazania
W celu rozrzedzenia wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienia jej wykrztuszania u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Działanie
Mukolityczne, ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych - zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

- 1 tabletka ACC dwa lub trzy razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

- 1 tabletka ACC dwa razy na dobę

Skład
1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną: 200mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, aromat jeżynowy "B".

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ACC:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku ACC,
- Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- Jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy),
- ból głowy, szumy uszne,
- przyspieszone bicie serca (tachykardia); obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
- nudności, wymioty, biegunka ból brzucha.

Rzadko występujące działania niepożądane :

- niestrawność,
- duszność,
- skurcz oskrzeli.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane :

- reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego,
- krwotok.

Ostrzeżenia

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości):

- astmy,
- niewydolności oddechowej,
- choroby wrzodowej,
- problemów z odkrztuszaniem,

należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa