

4 Flex Puregel żel 100 mg/g 100 g

Cena: 31,02 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | 4 FLEX |
| Opakowanie | 100 g |
| Postać | Żel |
| Producent | PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O. |
| Przeznaczenie | Chłodzące, Łagodzące (kojące), Przeciwbólowe, Przeciwzapalne |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

4Flex PureGel to lek w postaci żelu, który stosuje się miejscowo w leczeniu bólu oraz stanów zapalnych. Jego skład opiera się na jednej substancji czynnej, która to naproksen, występujący w dawce 100 mg na gram żelu.

Wskazania

- Miejscowe, objawowe leczenie bólu mięśniowo-stawowego.
- Łagodzenie objawów bólowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Przeciwzapalnie, przeciwbólowe, poprawia ruchomość stawu.

Dawkowanie

Dorośli: stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: naproksen 100 mg,
- pozostałe składniki (substancje pomocnicze): trolamina, etanol 96%, karbomer, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na naproksen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest stan zapalny skóry, otwarte rany albo uszkodzenie skóry.



Działania niepożądane

Rzadko:

- podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, swędzenie), które ustępuje po odstawieniu leku.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas stosowania innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną..
- Nie stosować żelu na błony śluzowe i do oczu, jeśli lek przypadkowo dostał się w wymienione miejsca, to należy obficie płukać wodą.
- Podczas leczenia, a także 2 tygodnie po jego zakończeniu należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i solarium.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie stosować po 6 miesiącach od pierwszego otwarcia leku.

Producent

Bausch Health Ireland Limited
Lake Drive Citywest Business
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia