

Acatar Allergy aer.donosa 1mg/ml 10ml aer.do nosa, roztw. 1 mg/ml 1 but. po 10 ml



Cena: 32,04 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACATAR
Opakowanie	1 but. po 10 ml
Postać	Aerozol
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 1 dnia życia, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Acatar Allergy to lek w postaci przejrzystego roztworu do nosa, bezbarwnego, przeznaczony do użytku u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Głównym składnikiem jest azelastyna, która należy do grupy leków działających poprzez hamowanie działania histaminy (przeciwhistaminowe) i innych substancji wydzielanych przez organizm podczas reakcji alergicznej. Te substancje zazwyczaj powodują u pacjenta objawy takie jak wodnisty katar, kichanie, swędzenie lub uczucie zatkanego nosa. Lek Acatar Allergy stosuje się w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zarówno sezonowego, jak i poza sezonem, oraz w okresie zaostrzeń.

Wskazania

Lek Acatar Allergy stosuje się w leczeniu objawowym:

- sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów),
- niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działanie

Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie aerozolu Acatar Allergy dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat to po 1 aplikacji do każdego otworu nosowego 2 razy dziennie. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji aerozolu na alergię znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Skład

1 ml Acatar Allerg zawiera:



- substancję czynną: azelastyny chlorowodorek 1 mg,
- pozostałe składniki: hypromeloza 2910, disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Acatar Allergy:

- jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: po podaniu może pojawić się w ustach nieprzyjemny smak (często wskutek nieprawidłowej metody podania, mianowicie zbytniego odchylenia głowy do tyłu podczas podawania), co w rzadkich przypadkach może prowadzić do nudności.

Ostrzeżenia

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Nie stosować dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym użyciu.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław