

ACC Classic 20 mg/ml Roztwór doustny smak wiśniowy 100 ml



Cena: 20,79 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACC
Opakowanie	1 butelka po 100 ml
Postać	Roztwór
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Kaszel
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Acc Classic 20 mg/ml lek w postaci roztworu doustnego o smaku wiśniowym. Zawiera Acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie. Polecany dla osób dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

Wskazania

Mokry kaszel, w celu rozrzedzania i ułatwiania odkrztuszania wydzieliny z dróg oddechowych.

Działanie

Rozrzedzające wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiającej jej odkrztuszanie.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w dawkach podzielnych)
- Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 10 ml roztworu dwa razy na dobę (400 mg acetylocysteiny na dobę)
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 10 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (400 mg do 600 mg acetylocysteiny na dobę w dawkach podzielnych)

Skład

1ml zawiera 20mg acetylocysteiny; pozostałe składniki leku: karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan (E218), sodu benzoesan (E211), sodu edetynian, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat wiśniowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ACC classic:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoosan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku ACC classic,
- Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- Jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy), ból głowy, szumy uszne, przyspieszone bicie serca (tachykardia); obniżone ciśnienie tętnicze krwi, nudności, wymioty, biegunka ból brzucha.

Rzadko występujące działania niepożądane: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli.

Ostrzeżenia

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości):

- astmy,
- niewydolności oddechowej,
- choroby wrzodowej,
- problemów z odkrztuszaniem,

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa

Galeria

