

Aciclovir Ziaja krem 0,05 g/g 5 g (tuba)



Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZIAJA
Opakowanie	5 g (tub.)
Postać	krem
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opryszczka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aciclovir Ziaja to lek w postaci kremu przeznaczony do stosowania na skórę. Jest on przeznaczony do miejscowego leczenia nawrotowej opryszczki warg i twarzy, zwanej potocznie "zimnem". Przyczyną tej dolegliwości jest wirus opryszczki pospolitej Herpes simplex. Aktywnym składnikiem tego leku jest acyklowir, substancja o silnym działaniu przeciwwirusowym skierowanym przeciwko wirusowi Herpes simplex. Skuteczność leku Aciclovir Ziaja jest największa, gdy rozpoczyna się leczenie jak najwcześniej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki, takich jak pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można także rozpocząć w późniejszym stadium choroby, gdy pojawią się grudki lub pęcherzyki.

Wskazania

Miejscowe leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Działanie

Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Aciclovir Ziaja należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.

Leczenie należy prowadzić co najmniej 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Skład

1 g kremu zawiera:



- substancję czynną: acyklowir 50 mg,
- pozostałe składniki: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła lekka, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku oraz walacyklowir.

Działania niepożądane

- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, swędzenie.

Ostrzeżenia

- Produkt leczniczy działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu produktu leczniczego, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich rękami.

- Nie należy stosować produktu leczniczego na błony śluzowe np. ust lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych.
- W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.
- Nie zaleca się stosowania Aciclovir Ziaja przez osoby z obniżoną odpornością.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk