


Aescin 20 mg, 30 tabletek dojelitowych

Cena: 19,56 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aescin, jako lek, wykazuje działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne oraz poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Redukuje przepuszczalność ścian naczyń, co ma znaczenie szczególnie w przypadku obrzęków pooperacyjnych i pourazowych. Ponadto, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i zmniejsza ryzyko ich wystąpienia po operacjach, zwłaszcza ortopedycznych. Aescin uszczelnia śródbłonek naczyń krwionośnych, co przyczynia się do poprawy krążenia żylnolimfatycznego. Ponadto, stosowany jest w profilaktyce zakrzepowego zapalenia żył pooperacyjnego oraz w leczeniu zaburzeń krążenia żylnolimfatycznego i żyłaków kończyn dolnych.

Wskazania

Wskazania do stosowania Aescin 20 mg, 30 tabletek powlekanych:

- Leczenie przewlekłej niewydolności żylniej, żyłaków kończyn dolnych, żyłaków odbytu.
- Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.
- Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Dawkowanie

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Skład

Substancją czynną leku jest alfa-escyna w ilości 20 mg na 1 tabletkę dojelitową.

Przeciwwskazania

Leku Aescin nie należy stosować u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami nerek, zagrażającymi ich niewydolnością oraz u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia

Jeżeli po zastosowaniu leku Aescin u pacjenta wystąpią poniższe objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:



- zapalenie skóry
- zapalenie zakrzepowe żył
- podskórne stwardnienia (grudki pod skórą)
- wrzody skórne
- ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi
- nagły obrzęk jednej lub obu nóg
- niewydolność serca lub nerek.