

Aesculan 62,5 mg + 5 mg Maść doodbytnicza 30 g

Cena: 27,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AESCULAN
Opakowanie	30 g
Postać	Maść
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aesculan to maść doodbytnicza, która znajduje zastosowanie w następstwie początkowej fazy choroby hemoroidalnej. Przynosi ulgę w przypadku związanym z bólem, świądu oraz dyskomfortem związanym z hemoroidami, a także związanym z nimi związanymi krwawieniami. Preparat zawiera dwa aktywne składniki: suchy wyciąg z kory kasztanowca (*Aesculus hippocastanum* L., cortex) oraz lidokainę w postaci chlorowodoru.

Skuteczność tego leku w odpowiedzi na pytania z późniejszego zastosowania w praktyce i doświadczeniu. Maść działa miejscowo przeciwbólowo, znieczulająco, przeciwzapalnie i ściągająco. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli wystąpią młodsi członkowie, zaleca się skonsultowanie korzystania z maści doodbytniczej z możliwością. W przypadku pojawienia się także kaniula, możliwe jest umieszczenie aplikacji w okolicy odbytu.

Wskazania

Łagodzenie objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzujących się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu.

Działanie

Łagodzące, miejscowo znieczulające, ściągające i przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, nałożyć ok. 0,5-1,0 g leku (pasma o długości około 2 cm) na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy za pomocą załączonej kaniuli 2-3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów.

Skład

1 g maści zawiera:

- substancje czynne: wyciąg suchy z *Aesculus hippocastanum* L., cortex, (kora kasztanowca) (40-90:1), rozpuszczalnik

ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v) 62,5 mg; lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum) 5 mg.

- substancje pomocnicze: tanina, olejek eteryczny rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- w przypadku nadwrażliwości, na którykolwiek składnik leku,
- w przypadku uczulenia na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę.
- w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny Asteraceae.

Działania niepożądane

Użycie miejscowe leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek może powodować reakcje alergiczne.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

