

Aleve tabletki powlekane 220 mg, 12 tabletek

Cena: 11,10 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALEVE
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Aleve to preparat w postaci tabletek powlekanych, polecany do łagodzenia bólu o niewielkim i umiarkowanym nasileniu. Może być stosowany u dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia.

Wskazania

- Ból o małym do umiarkowanego nasilenia: ból głowy, zęba, mięśniowe, stawowe, pleców, bolesne miesiączkowanie, dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem,
- Gorączka (m.in. towarzysząca przeziębieniu).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież po 16 roku życia: 1 tabletkę, co 8 do 12 godzin, do czasu ustąpienia objawów.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: naproksen sodowy 220 mg,
- substancje pomocnicze: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian, Opadry Blue YS-1-4215, tytanu dwutlenek, hypromeloza, Makrogol 8000, indygotyna E132.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aleve:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli w przeszłości po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiła astma oskrzelowa, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego,
- jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub doszło do przebicia ściany przewodu pokarmowego,
- jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową,
- jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, nerek, wątroby,
- jeśli kilkakrotnie stwierdzono owrzodzenie przewodu pokarmowego lub krwawienie z owrzodzenia w wywiadzie,
- jeśli pacjent odczuwa dolegliwości przewodu pokarmowego
- w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki głowy,
- nudności, zgaga, ból brzucha, niestrawność.

Niezbym często występujące działania niepożądane:

- senność, ospałość, bezsenność,
- biegunka, wymioty, zaparcia,
- zawroty głowy,
- pokrzywka, świąd, wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane:

- zaburzenia czynności nerek,
- obrzęk naczynioruchowy,
- obrzęki rąk i nóg (szczególnie u osób z nadciśnieniem i/lub niewydolnością nerek),
- owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, smoliste stolce.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane :

- reakcje nadwrażliwości,
- zaburzenia układu krwiotwórczego,
- zaburzenia psychiczne, depresja,
- upośledzenie słuchu, szumy uszne,
- duszność, astma oskrzelowa,
- zapalenie odcinka przewodu pokarmowego, zapalenie przetyku,
- zapalenie wątroby, żółtaczka,
- łysienie, rumień, nadmierna potliwość,
- zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
- złe samopoczucie.

Ostrzeżenia

- U osób w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Należy unikać stosowania naproksenu z innymi lekami z grupy NLPZ.
- Zastosowanie leku Aleve należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku niektórych schorzeń (zaburzenia krzepnięcia, ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca, występują niepokojące objawy brzuszne).
- Należy rozważyć stosowanie produktu jeśli w przeszłości występowała wysypka skórna.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

BAYER SP. Z O.O.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa