

Allergodil krople do oczu 10 ml



Cena: 34,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALLERGODIL
Opakowanie	6 ml (butelka)
Postać	Krople do oczu
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Uczulenie, Zapalenie spojówek
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Allergodil to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym do stosowania w alergicznym zapaleniu spojówek. Łagodzi objawy swędzenia, zaczerwienienia oraz łzawienia oczu.

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.
- Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat..

Działanie

Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

Dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli: 1 kropla do każdego oka, 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: azelastyny chlorowodorek 0,5 mg, co odpowiada 0,015 mg w jednej kropli (pojemność około 30 mikrolitrów),
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wersenian, hypromeloza, sorbitol – roztwór 70%, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Allergodil:



- w przypadku nadwrażliwości na chlorowoderek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

- Kropli Allergodil nie należy stosować w leczeniu infekcji oka.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że występujące objawy ze strony oczu nie są spowodowane przez alergię. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy objawy dotyczą jednego oka; jeśli objawy nie ustąpią po 48 godzinach od zastosowania leku.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować punktikowe zapalenie rogówki.
- Po zastosowaniu kropli nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych. Leku nie stosować na soczewki i po jego aplikacji należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem.
- Lek po pierwszym otwarciu ważny jest 4 tygodnie.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg, Niemcy