

Allertec WZF 10 mg, 7 tabletek

Cena: 13,28 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALLERTEC
Opakowanie	7 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Allertec WZF 10 mg to preparat przeciwalergiczny zawierający cetyryzyny dichlorowodorek jako substancję czynną. Jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i powyżej, a także u dorosłych. Lek występuje w postaci podłużnych tabletek, wypukłych z obu stron, z rowkiem ułatwiającym podział tabletki na pół.

Wskazania

Lek Allertec WZF 10 mg stosuje się u dzieci od 6. roku życia i dorosłych:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu),
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwanie utrzymujące się, silnie swędzące bąble na skórze).

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-12 lat: pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletką (10 mg) raz na dobę.

Skład

1 tabletką powlekana leku zawiera:

- substancja czynna: cetyryzyny dichlorowodorek 10 mg,



- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Allertec

- Jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek oraz hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Działania niepożądane

Często :

- zmęczenie,
- suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- senność,
- zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów wykazujących nietolerancję niektórych cukrów.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, konieczne może być zastosowanie mniejszej dawki leku.
- Przed zastosowaniem leku, należy poradzić się lekarza w przypadku występującej padaczki lub napadów drgawek w przeszłości, trudności z oddawaniem moczu.
- Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leków przeciwalergicznych.
- Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa