APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Alopexy 5 % (50 mg / ml) roztwór na skórę, 3 x 60 ml

Cena: 95,59 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Głowa, Skóra, Włosy
Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	ALOPEXY
Opakowanie	3 x 60 ml
Postać	Roztwór
Producent	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Przeznaczenie	Łysienie
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis
Alopexy to lek stworzony specjalnie dla mężczyzn borykających się z problemem łysienia. Jego wskazaniem jest łysienie androgenowe typu męskiego (alopecia androgenetica) o umiarkowanym nasileniu. Każdy mililitr roztworu Alopexy zawiera 50 mg minoksydylu - substancji czynnej, która, gdy jest stosowana miejscowo na skórę głowy, stymuluje wzrost keratynocytów i włosów. Alopexy należy aplikować na obszarze łysienia i delikatnie rozprowadzać palcami na całej leczonej powierzchni skóry. Zazwyczaj wzrost włosów można zaobserwować około 2 miesięcy po rozpoczęciu leczenia, pod warunkiem systematycznego stosowania produktu oraz indywidualnych cech pacjenta. Po aplikacji miejscowej, minoksydyl w niewielkim stopniu wchłania się do krążenia ogólnego, a średnio 1,7% stosowanej dawki dociera do organizmu. Alopexy nie jest zalecane dla kobiet ze względu na ograniczoną skuteczność oraz możliwość nadmiernego owłosienia na obszarach spoza miejsca stosowania.

Alopexy należy do grupy leków dermatologicznych i jest dostępny w postaci przezroczystego, jasnożółtego roztworu do stosowania miejscowego na skórę. Opakowanie Alopexy zawiera trzy butelki wyposażone w pompkę dozującą z aplikatorem, co ułatwia wygodne stosowanie leku.

Wskazania
Alopexy stosowane jest w łysieniu typu męskiego o umiarkowanym nasileniu.

Działanie
Alopexy jest znany z pobudzania wzrostu włosów u niektórych pacjentów cierpiących na łysienie androgenowe. Zazwyczaj po około 2 miesiącach regularnego stosowania produktu można zaobserwować wzrost nowych włosów. Jednak tempo wzrostu włosów może różnić się w zależności od indywidualnych cech pacjenta. Należy pamiętać, że po zaprzestaniu stosowania Alopexy, wzrost włosów zostaje zahamowany, a po około 3-4 miesiącach włosy wracają do stanu sprzed rozpoczęcia leczenia.

Stosowanie

Nie należy stosować Alopexy jednocześnie z innymi lekami dermatologicznymi zawierającymi tretynoinę, antralinę lub dipropionian betametazonu, ponieważ mogą one wpływać na ilość minoksydylu obecnego we krwi.

Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie przyjmowanych lub ostatnio stosowanych lekach, a także o lekach, które planuje się zażywać, włączając w to leki dostępne bez recepty.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Alopexy może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Alopexy i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

- Obniżenia ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej lub przyspieszonego tętna.
- Omdleń lub zawrotów głowy.
- Nagłego i nieoczekiwanego zwiększenia masy ciała, opuchlizny rąk lub stóp (obrzęku).
- Utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia owłosionej skóry głowy.

Podczas stosowania Alopexy mogą wystąpić również inne działania niepożądane. Bardzo często mogą występować:

- Nadmierne owłosienie w miejscach, w których lek nie był stosowany, zwłaszcza u kobiet.
- Bóle głowy.

Często występujące działania niepożądane to:

- Miejscowe reakcje skórne, takie jak podrażnienie skóry z łuszczącym się naskórkiem, świąd, zaczerwienienie, zapalenie, suchość skóry, wysypka.
- Bóle mięśniowo-szkieletowe.
- Obrzęki kończyn.
- Ból w miejscu aplikacji.
- Trudności z oddychanie:m.
- Depresja.

Działania niepożądane o nieznanej częstości obejmują:

- Infekcje ucha.
- Zapalenie ucha zewnętrznego.
- Nieżyt nosa.
- Nadwrażliwość.
- Zapalenie nerwu.
- Uczucie mrowienia.
- Zaburzenia smaku.
- Uczucie pieczenia.
- Zaburzenia widzenia.
- Podrażnienie oka.
- Zawroty głowy.
- Obniżenie ciśnienia tętniczego.
- Ból w klatce piersiowej.
- Osłabienie.
- Obrzęk twarzy.
- Rumień.
- Wysypka.
- Wypadanie włosów.
- Nierównomierne owłosienie ciała.
- Zmiana koloru włosów.
- Zmiana tekstury włosów.
- Zapalenie wątroby.
- Kamica nerkowa.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać dalsze wskazówki i ocenę sytuacji.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Alopexy należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet ze względu na częste występowanie nadmiernego owłosienia poza miejscami jego stosowania.
- Jeśli pacjent ma lub miał wcześniej choroby układu krążenia lub zaburzenia rytmu serca, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Alopexy.
- Jeśli w rodzinie pacjenta nie występuje łysienie, a wypadanie włosów jest nagłe, częściowe lub wystąpiło po porodzie, lub jeśli przyczyna wypadania włosów nie jest znana, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować leku na czerwoną, zapaloną, zainfekowaną, podrażnioną lub bolesną skórę owłosionej głowy. Lek powinien być stosowany tylko na zdrową skórę głowy. Jeśli skóra jest uszkodzona, większe ilości minoksydylu mogą przenikać do krwi.
- Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi lekami stosowanymi na skórę głowy.
- Lek zawiera etanol (alkohol) i może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie w przypadku kontaktu z oczami, ranami, podrażnioną skórą lub błonami śluzowymi. W razie kontaktu należy dokładnie przemyć te obszary bieżącą, zimną wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy unikać ekspozycji leczonej skóry głowy na słońce i nosić nakrycie głowy (kapelusz).
- Lek nie powinien być połykany. W przypadku połknięcia leku należy skontaktować się z lekarzem. Przyjmowanie przypadkowe może prowadzić do objawów wynikających z działania minoksydylu na układ sercowo-naczyniowy. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy wdychać rozpylanego leku.
- U niektórych pacjentów mogą wystąpić zmiany koloru i/lub tekstury włosów.
- Każda dawka leku Alopexy zawiera 240 mg glikolu propylenowego, co odpowiada 240 mg glikolu 3 propylenowego w 1 ml roztworu.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować tego produktu leczniczego w czasie ciąży i karmienia piersią.

Producent
Pierre Fabre Dermatologie
45, place Abel Gance
92100 Boulogne, Francja