


Ambroksol Orifarm syrop 30 mg/5ml 150 ml



Cena: 14,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Łagodzące (kojące), Mukolityczne, Ułatwiający oddychanie, Wykrztuśne
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	ORIFARM HEALTHCARE A/S
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Ambroksol Orifarm to syrop leczniczy o smaku bananowym. Jego substancją czynną jest chlorowodorek ambroksolu, który pochodzi od bromoheksyny. Ten składnik należy do kategorii leków, które pobudzają wydzielanie śluzu w oskrzelach i jednocześnie zmniejszają jego lepkość.

Wskazania

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, w tym:

- ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli,
- stany zapalne nosa i gardła,
- mukowiscydoza.

Działanie

Wykrztuśne i mukolityczne (rozrzedzające śluz).

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (15 mg ambroksolu) 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml syropu (30 mg ambroksolu) do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, a

Skład

5 ml leku zawiera:

- substancję czynną: ambroksolu chlorowodorek 30 mg,
- pozostałe składniki: sorbitol ciekły, niekryształizujący; glicerol 85%; kwas benzoesowy (E 210); kwas propionowy; esencja

bananowa (zawiera m.in. glikol propylenowy (E 1520), metyloheptyno-węglan, eugenol, cytral, izoeugenol, siarczyny); woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów u których występuje skurcz oskrzeli.

Działania niepożądane

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, reakcje uczuleniowe, takie jak: odczyny skórne, zaczerwienienie i (lub) pieczenie błon śluzowych, obrzęk twarzy, duszności, dreszcze, wysypka, pokrzywka, bóle brzucha, zaparcia, zgaga, niestrawność, nudności i wymioty.

Ostrzeżenia

- Lek należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli.
- U pacjentów z astmą oskrzelową lek może początkowo nasilać kaszel.
- Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit.
- Lek Ambroksol Orifarm zawiera w składzie sorbitol.
- Nie zaleca się podawania leku bezpośrednio przed snem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25oC. Nie zamrażać.

Producent

ORIFARM HEALTHCARE A/S

Galeria

