

Anesteloc Max 20 mg, 14 tabletek

Cena: 8,43 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Anesteloc Max to lek dla dorosłych stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (GERD), takich jak zgaga (bolesne uczucie pieczenia) i kwaśny posmak w ustach. GERD polega na cofaniu się kwasu żołądkowego do przełyku. Substancją czynną leku Anesteloc Max firmy Adamed Pharma jest pantoprazol, który hamuje enzym odpowiedzialny za wytwarzanie kwasu żołądkowego. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Wskazania

W krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku u dorosłych.

Działanie

Lek Anesteloc Max zmniejsza ilość kwasu w żołądku, usuwając dolegliwości związane z chorobą refluksową.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka na dobę. Nie stosować większej dawki niż 20 mg na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego (Pantoprazolum).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Anesteloc Max:

- uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane

- łagodne polipy żołądka.

- ból głowy, zawroty głowy,
- biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
- zaburzenia odczuwania smaku,
- zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie),
- bóle stawów, bóle mięśni,

Ostrzeżenia

- Bez konsultacji z lekarzem, leku nie stosować dłużej niż 4 tygodnie.
- Jeśli objawy choroby refluksowej utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem.
- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z: ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, zmniejszeniem stężenia magnezu we krwi.
- Leku nie należy stosować zapobiegawczo.
- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku gdy: pacjent jest leczony z powodu zgagi lub niestawności przez 4 lub więcej tygodnie, pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka/przeszedł operację żołądka, pacjent ma problemy z wątrobą, w przeszłości występowała reakcja skórna na lek podobny do Anesteloc Max.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.