

Antidol 15 500 mg + 15 mg Lek przeciwbólowy 10 sztuk

Cena: 17,40 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabl. (blist.)
Postać	tabl.
Producent	SANDOZ GMBH

Opis produktu

Składniki

1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu (jako Compap L 90 %) i 15 mg fosforanu kodeiny, Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana żelowana, kwas stearynowy, powidon, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Stosowanie

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

1-2 tabletki, w razie konieczności można powtarzać dawkę do 4 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę), nie częściej niż co 6 godzin.

Młodzież w wieku od 12 do 15 lat

W razie konieczności 1 tabletkę co 6 godzin (maksymalnie 4 tabletki na dobę). Bez zalecenia lekarza leku nie przyjmować dłużej niż 3 dni. Lek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Szczegółowe informacje w ulotce.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku ANTIDOL 15 jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i kodeinę. W razie przedawkowania natychmiast zasięgnąć porady medycznej, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre, z powodu ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia wątroby.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Producent

Sandoz GmbH

Opis

Antidol 15 500 mg + 15 mg Lek przeciwbólowy 10 sztuk

Galeria

