

# AntyGrypin Complex 500 mg + 200 mg + 4 mg, granulat musujący, 10 saszetek



Cena: 22,33 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ANTYGRYPIN
Opakowanie	10 saszetek
Postać	granulki
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

## Opis produktu

### Opis

**AntyGrypin Complex 500 mg + 200 mg + 4 mg** to preparat leczniczy w formie granulatu musującego, który należy rozpuścić w wodzie przed spożyciem. Skierowany jest do osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15. roku życia i służy do leczenia objawów przeziębienia, grypy oraz dolegliwości grypopodobnych.

### Wskazania

Do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

### Działanie

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

### Dawkowanie

Dorośli i młodzieży powyżej 15 lat: 1 saszetkę na 30 minut przed snem.

### Skład

Zawartość 1 saszetki:

- Substancja czynna: 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 4 mg chlorofenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas).
- Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sacharoza, magnezu cytrynian, sodu cyklaminian (E 952), sacharyna sodowa (E 954), aromat cytrynowy (Tetrarome Lemon P 0551 987323: maltodekstryna kukurydziana, składniki

aromatyzujące (limonen, beta-pinen, cytral, gamma-terpinen, linalol), alfa tokoferol (E 307)).

### Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku AntyGrypin Complex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent choruje na niewydolność wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki wpływające na czynność wątroby;
- jeśli pacjent nadużywa alkoholu;
- jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu, związanym z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł krokowy;
- u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, stosowane w leczeniu depresji), obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni;
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

### Działania niepożądane

Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi:

- obrzęk krtani, co uniemożliwia oddychanie (pojedyncze przypadki);
- wstrząs anafilaktyczny, objawia się splątaniem, blednością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem (pojedyncze przypadki);
- rumień wielopostaciowy (pojedyncze przypadki);
- ciężka reakcja skórna: toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), ostra uogólniona osutka krostkowa objawiająca się wysypką z krostami na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczeniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi (bardzo rzadkie przypadki);
- uporczywe swędzenie skóry (świąd), wysypka na skórze, nadmierne pocenie się, pojawienie się na skórze wykwitów grudkowych, krwotocznych lub pęcherzykowych (plamica), reakcją alergiczną przypominającą powodującą obrzmienia tkanek znajdujących się pod skórą (obrzęk naczynioruchowy), reakcją alergiczną powodującą powstawanie pęcherzy na skórze (pokrzywka); występują rzadko;
- ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zaburzenie czynności (niewydolność) wątroby, nieodwracalne uszkodzenie (martwica) wątroby, zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu (żółtaczką); występują rzadko.

### Producent

NATUR PRODUKT PHARMA  
Podstoczysko 30  
Ostrów Mazowiecka