

Apap Extra, 24 tabletki powlekane

Cena: 23,81 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Głowa
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Apap Extra to lek, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol (500 mg) i kofeinę (65 mg). Paracetamol jest skutecznym środkiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który jest stosowany do doraźnego łagodzenia różnego rodzaju bólu, takiego jak ból głowy, mięśni, kości, stawów, bóle menstruacyjne, bóle pourazowe, pooperacyjne lub nerwobóle. Kofeina, z kolei, wzmacnia działanie przeciwbólowe paracetamolu i działa umiarkowanie stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Apap Extra jest dostępny w postaci podłużnych tabletek powlekanych o kolorze białym. Jest przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie powinno być ustalone zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, a nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Przed zastosowaniem Apap Extra zawsze warto zapoznać się z ulotką leku, która zawiera informacje dotyczące wskazań, przeciwwskazań, dawkowania oraz możliwych działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania Apap Extra, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wskazania

Apap Extra jest wskazany do stosowania w łagodzeniu objawów bólu o różnej etiologii, takich jak ból głowy (w tym migrena), ból mięśni, ból zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle kostno-stawowe, bóle pooperacyjne i pourazowe. Ponadto, lek może również być stosowany do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Działanie

Apap Extra zawiera dwie substancje czynne: paracetamol (500 mg w jednej tabletkce) i kofeinę (65 mg w jednej tabletkce). Paracetamol jest substancją przeciwbólową i przeciwgorączkową, która działa poprzez hamowanie enzymów odpowiedzialnych za syntezę prostaglandyn, które są mediatorami bólu i gorączki. Paracetamol jest powszechnie stosowany do łagodzenia bólu różnego pochodzenia oraz obniżania gorączki. Dodatkowo, kofeina zawarta w Apap Extra działa jako substancja wspomagająca, wzmacnia działanie przeciwbólowe paracetamolu. Kofeina działa również pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, co może przyczynić się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i zwiększenia czujności.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabletki co 4-6 godzin (maksymalnie 8 tabletek na dobę).
- Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku.
- Sposób podawania: doustnie.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), kofeina (Coffeinum).

1 tabletkę powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku Apap Extra w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- W przypadku niedokrwistości hemolitycznej, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, oraz zaburzeń rytmu serca.
- Lek nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (monoaminooksydaz) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych interakcji lekowych.
- Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12. roku życia, ponieważ dawkowanie i bezpieczeństwo stosowania u dzieci w tym wieku nie zostały ustalone.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 osób): skórne reakcje uczuleniowe, nudności, wymioty, bóle brzucha.

Bardzo rzadko występujące (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób): ciężkie reakcje skórne, małopłytkowość objawiająca się wybroczynami i skłonnością do siniaków, agranulocytoza (brak jednego rodzaju białych krwinek objawiająca się podatnością na zakażenia), zawroty głowy, martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa.

W przypadku, gdy lek zawierający kofeinę będzie podawany w zalecanym dawkowaniu w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze wzrostem całkowitej dawki kofeiny takich jak:

Nieznana częstość działań niepożądanych:

- niemierność rytmu serca
- bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku Apap Extra, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie stosowanych lub stosowanych ostatnio lekach, oraz o planowanych lekach. Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i kofeinę. W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych, leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny), ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, leków uspokajających i nasennych, inhibitorów MAO, zydowudyny, leków sympatykomimetycznych (takich jak zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy), niesteroidowych leków przeciwzapalnych, hormonów tarczycy, doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny, chloramfenikolu, chinolonów i werapamilu, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Apap Extra w celu uzyskania opinii medycznej.

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apap Extra zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu, aby uniknąć ryzyka przedawkowania.
- Osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu lub będące na głodzie powinny być ostrożne w stosowaniu tego leku,

ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.

- U osób z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, lub zaburzeniami snu w postaci bezsenności, należy stosować lek ostrożnie.
- W trakcie przyjmowania leku nie wolno spożywać alkoholu, ponieważ zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby.
- Osoby głodzone regularnie pijące alkohol są szczególnie narażone na ryzyko uszkodzenia wątroby.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować w I trymestrze ciąży.
- W II i III trymestrze ciąży przed zastosowaniem leku również należy skonsultować się z lekarzem.
- Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.