


Apap Przeziębienie Junior, 6 saszetek



Cena: 22,57 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APAP
Opakowanie	6 saszetek
Postać	Proszek
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Apap Junior przeziębienie to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, zawierający 300 mg paracetamolu, 20 mg witaminy C oraz 5 mg fenylefryny. Paracetamol pełni funkcję leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego. Apap Junior jest stosowany w leczeniu objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Wskazania

Lek przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat w krótkotrwałym leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak:

- gorączka i dreszcze,
- ból głowy,
- bóle mięśniowo-stawowe,
- ból gardła,
- niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem,
- nieżyt błony śluzowej nosa (katar).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: od 1 do 2 saszetek nie częściej niż co 4–6 godzin, maksymalnie 6 saszetek na dobę.
- Dzieci w wieku 6-12. lat (26-40kg): 1 saszetka nie częściej niż co 4–6 godzin, maksymalnie 4 saszetki na dobę.

Skład

1 saszetka zawiera:

- Paracetamolum 300mg, Acidum ascorbicum 20mg, Phenylephrini hydrochloridum 5mg.
- substancje pomocnicze: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy sproszkowany 877834, aromat truskawkowy sproszkowany 877874, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować w przypadku występowania: niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, wrodzonych niedoborów enzymów (dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, wirusowego zapalenia wątroby (WZW), choroby alkoholowej, jaskry z wąskim kątem przesączania, anatomicznie wąskiego kąta przesączania.

Działania niepożądane

Do działań niepożądanych występujących rzadko należą: depresja i splątanie, drżenia, rozszerzenie źrenic, obrzęki, biegunka i bóle brzucha, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) i nieprawidłowa czynność wątroby, świąd, pocenie się, złe samopoczucie, gorączka oraz nadmierne uspokojenie.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko to: niedokrwistość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, plamica barwnikowa i jałowy ropomocz (mętny mocz).

Ostrzeżenia

- Lek Apap przeziębienie junior zawiera sód: 3,48 mmol (127,8 mg) w maksymalnej dawce 6 saszetek. Odpowiada to 6,3% maksymalnej dawki dobowej sodu.

Lek zawiera alkohol benzylowy, który może powodować reakcje alergiczne.

- Produkt zawiera dekstrozę i syrop glukozowy: 15,0 mg/na saszetkę dekstrozy i 29,8 mg/na saszetkę syropu glukozowego. Należy mieć to na uwadze, szczególnie u pacjentów z cukrzycą.
- Jeśli Pacjent cierpi na: niewydolność wątroby lub nerek, guz chromochłonny nadnerczy, astmę oskrzelową, rozrost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, zespół Raynauda, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, czy cukrzycę lub przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, przed zastosowaniem leku Apap przeziębienie junior należy zasięgnąć porady lekarza.
- Stosowanie leku może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.
- W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław