

# Apirectal czop.doodbyt. 10 czopków



Cena: 22,51 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APIRECTAL
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	, Hemoroidy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Apirectal** to preparat w formie czopków doodbytniczych, kwasu hialuronowego oraz propolisu, w celu wspomaganie wytwarzania błon śluzowych odbytu u urządzeń zewnętrznych i hemoroidów. Produkt Farmina Apirectal, dostępny w 10 sztukach, może być również używany w kontekście zabiegów chirurgicznych w obszarach odbytu. Po przystosowaniu w odbyciu, czopek Apirectal tworzy hydrożel, który otacza błony śluzowe, wypływa je przed wejściem. Ten nawilżający żel wspomaga proces nakładania nabłonka odbytu i stanowi warunek dla naturalnych urządzeń regeneracyjnych.

### Skład

Sól sodowa kwasu hialuronowego, etanolowy ekstraktu propolisu, glikole polioksyetylenowe.

1 globulka zawiera:

- 10 mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (Sodium Hyaluronate),
- 50 mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (ethanolic extract of propolis).

### Zastosowanie

- Odtworzenie naturalnego stanu fizjologicznego błon śluzowych odbytu u pacjentów ze stwierdzonymi zewnętrznymi i wewnętrznymi hemoroidami.
- Po zabiegach chirurgicznych w obrębie odbytu.

### Sposób użycia

- Czopek Apirectal należy wprowadzić do odbytu po wypróżnieniu, najlepiej na noc.
- Zaleca się aplikowanie czopka w pozycji stojącej, lekko pochylonej w przód.
- Wyjmij czopek z folii i natychmiast wprowadź go do odbytu.



- W zależności od stopnia nasilenia zmian stosuj od 1 do 2 czopków dziennie.
- Jeśli stosujesz dwa czopki dziennie, jeden czopek zaaplikuj przed południem, a drugi na noc.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **Ostrzeżenia**

- Nie stosować w przypadku uszkodzenia którejkolwiek części opakowania.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Jeżeli po zastosowaniu wyrobu medycznego wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk, bądź inne niewystępujące wcześniej dolegliwości w okolicy odbytu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
- Jeżeli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie zmian, jednak po ukończeniu leczenia dolegliwości powrócą, nie należy wznawiać stosowania produktu, ale udać się do lekarza.
- U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Ważne wskazówki**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić przed światłem.