

Apitussic syrop dla dzieci i dorosłych 120 ml



Cena: 11,30 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Drogi oddechowe
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból gardła, Kaszel mokry, Zapalenie gardła
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Apitussic to syrop wykrztuśny dostępny w postaci leku, który jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorosłych. Stosuje się go w przypadku stanów zapalnych górnych dróg oddechowych, które objawiają się kaszlem, chrypką oraz bólem gardła. Syrop Apitussic działa poprzez rozluźnianie zalegającej wydzieliny w drzewie oskrzelowym, zmniejszanie lepkości śluzu oraz stymulację czynności rzęsek nabłonka migawkowego. To z kolei ułatwia przesuwanie śluzu w oskrzelach i ułatwia odkrztuszenie. W składzie preparatu znajduje się ziołomiód sosnowy, który dodatkowo wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. Warto również zaznaczyć, że Apitussic nie powoduje zaburzeń składu mikroflory przewodu pokarmowego.

Wskazania

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Działanie

Wykrztuśnie i rozrzedzające zalegającą wydzielinę w drzewie oskrzelowym.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty).
- Dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty).
- Dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa).

Składniki

5 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: sulfogwajakol 52 mg,
- substancje pomocnicze o znanym działaniu: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), sodu benzoesan, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Apitussic w przypadku:

- Nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku.
- Rzadkich dziedzicznych zaburzeń związanych z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy lub niedoborem sacharozy izomaltozy.
- Uczulenia na produkty pszczele, ponieważ syrop zawiera ziołomiód sosnowy.
- Obecności czynnej choroby wrzodowej, gdyż lek może pogorszyć dolegliwości.
- Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny stosować tego leku.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku Apitussic nie zaobserwowano istotnych objawów niepożądanych. Jednak pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego mogą wystąpić. Istnieje również możliwość wystąpienia nadwrażliwości na składniki leku. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepożądanych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje

W przypadku zastosowania syropu Apitussic na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Ostrzeżenia

Osoby, które doświadczyły niepokojących objawów po zastosowaniu Apitussic, takich jak działanie przeczyszczające, powinny natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać, że podczas leczenia Apitussicem oraz w ciągu 24 godzin od ostatniego podania, metabolity gwajakolu obecne w moczu mogą wpływać na wyniki badań biochemicznych, w szczególności oznaczeń kwasu hydroksyindolooctowego

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków