

ASPICONT 75 mg 60 tabletek



Cena: 7,96 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	VITAMA S.A.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Aspiconc to preparat farmaceutyczny wykorzystywany w prewencji schorzeń związanych z układem sercowo-naczyniowym.

Dawkowanie

Zalecana dawka: 1 - 2 tabletki (75-150 mg) na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokryształiczna, kwas stearynowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); otoczka tabletki - hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspiconc:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany, leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi
- jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy
- jeśli po zastosowaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił

kiedykolwiek u pacjenta napad astmy

- jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby (ciężkie zaburzenia czynności nerek, wątroby)
- w ostatnim trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży) w dawkach powyżej 100 mg na dobę
- jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli pacjent zauważy którykolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Aspiconc i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nagłe świsły podczas oddychania, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne)

zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu, lub smoliste stolce

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aspiconc należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie lub inne substancje uczulające
- jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa lub jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech)
- jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku
- jeśli pacjent planuje poddać się zabiegowi chirurgicznemu (nawet niewielkiemu, tj. ekstrakcji zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew i dlatego może się zwiększyć ryzyko krwawienia
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę

Producent

Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa