

Aviomarin 50 mg choroba lokomocyjna tabletki 5 sztuk

Cena: 20,62 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AVIOMARIN
Opakowanie	5 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Aviomarin to lek w postaci tabletek, który służy do profilaktyki choroby lokomocyjnej oraz zapobiegania i leczenia nudności oraz wymiotów o różnym pochodzeniu.

Tabletki Aviomarin zawierają dimenhydrinat jako substancję czynną, która działa przeciwwymiotnie, przeciwhistaminowo oraz ma łagodne działanie uspokajające. Początek działania leku występuje około 20-30 minut po podaniu, a efekty terapeutyczne utrzymują się przez 3 do 6 godzin.

Aviomarin w postaci tabletek może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6 roku życia.

Wskazania

Zapobieganie chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg (jedna lub dwie tabletki). W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 400 mg (osiem tabletek).

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat Zalecana dawka to 50 mg (jedna tabletka). W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: dimenhydraminę 50 mg
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aviomarin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimenhydraminę, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występują: ostry napad astmy jaskra z wąskim kątem przesączania, guz chromochłonny, porfiria, przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu, padaczka.

Działania niepożądane

- Bardzo częste działania niepożądane to: senność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy.
- Częste działania niepożądane to: pobudzenie, zaburzenia snu, niepokój, drżenie, zaburzenia widzenia, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie osłabienia i zmęczenia, trudności w oddawaniu moczu, osłabienie mięśni.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aviomarin u pacjentów z: zaburzeniami czynności wątroby, nadczynnością tarczycy, spowolnieniem akcji serca, nadciśnieniem, hipokaliemią, niedoborem magnezu we krwi, przewlekłymi trudnościami w oddychaniu, astmą, zwężeniem odźwiernika, zaburzeniami czynności serca.
- Szczególna ostrożność zalecana jest również w przypadku równoczesnego przyjmowania niektórych leków przeciwaritmicznych.
- Przyjmowanie leku Aviomarin należy przerwać przynajmniej trzy dni przed planowanymi testami alergicznymi ze względu na możliwość otrzymania wyników fałszywie ujemnych.
- Długotrwałe stosowanie dimenhydraminy może prowadzić do zależności lekowej.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa

Galeria

