

Axoviral 50 mg / g, 10 g krem

Cena: 14,60 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AXOVIRAL
Opakowanie	10 g
Postać	krem
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opryszczka
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Axoviral w postaci kremu to lek przeznaczony do miejscowego leczenia opryszczki warg i twarzy. Jego substancją czynną jest acyklowir, który skutecznie zwalcza wirusa opryszczki pospolitej, powodując powodujący skutki opryszczki. Produkt ten jest bezpośrednio narażony na działanie skóry, aby uniknąć procesu, który uwalnia się z opryszczki.

Wskazania

W miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Przeciwwirusowe, wykazująca silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie

Nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie przedłużyć do 10 dni.

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir (1g zawiera 50mg acyklowiru). Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, sodu laurylosiarczan, poloksamer 407, wazelina biała i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Axoviral:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeżeli pacjent nie jest pewien, czy ma opryszczkę.



- Jeśli pacjent ma obniżoną odporność lub przyjmuje leki, które mogą osłabiać układ odpornościowy. Pacjent powinien zwrócić się do lekarza w razie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa.
- Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa, opryszczka nie zagoiła się całkowicie lub uległa nasileniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.