APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Baikadent żel do stosowania w jamie ustnej 15 g

Cena: 16,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 g (tub.)
Postać	żel do stos.w j.ust.
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Opis produktu

Opis
Baikadent to żel leczniczy przeznaczony do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia. Działa przeciwzapalnie poprzez zmniejszanie produkcji substancji powodujących stan zapalny w chorych tkankach, a także poprawia stan dziąseł poprzez stymulację aktywności komórek regenerujących. Substancje czynne żelu to zestaw flawonoidów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej, które wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, wpływając na bakterie chorobotwórcze. Baikadent działa również na bakterie wywołujące przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej. Stosowanie profilaktyczne żelu może zapobiegać rozwojowi chorób przyzębia i poprawiać stan dziąseł. Żel dostępny jest w tubie aluminiowej o pojemności 15g.

Wskazania
Baikadent może być stosowany w celu zapobiegania chorobom przyzębia oraz jako uzupełniający środek terapeutyczny w przypadku paradontopatii powierzchownych i głębokich. Preparat może również być skuteczny w przypadku przewlekłych stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej, w tym w przypadku urazów spowodowanych przez protezy.

Składniki
Substancją czynną w 100 g żelu jest Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis (tarczycy baikalskiej) 0,577 g
Substancje pomocnicze: Karbomer (Carbopol 5984), Glicerol, Parahydroksybenzoesan metylu, Parahydroksybenzoesan propylu, Glikol propylenowy, Wodorotlenek sodu, Węglan sodu bezwodny, Woda oczyszczona.

Stosowanie
Zaleca się, aby dorośli stosowali żel zewnętrznie, 2 do 4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów. Należy wetrzeć około 2 cm żelu w miejsca chorobowo zmienione w jamie ustnej i unikać jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu preparatu. W przypadku przewlekłych stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej, zaleca się systematyczne stosowanie produktu przez okres 2 tygodni. Jeśli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. Lek Baikadent zawiera składniki, takie jak glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienia skóry oraz metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywołać reakcje alergiczne.

Przechowywanie
Lek Baikadent powinien być przechowywany w temperaturze do 25°C, w miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci i niedostępne dla światła. Nie należy wyrzucać leków do kanalizacji ani do zwykłych koszy na odpadki. Należy skonsultować się z farmaceutą w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji nieużywanych leków, aby chronić środowisko.

Ostrzeżenia
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.