

Bioprazol Bio Max 20 mg, 14 kapsułek



Cena: 16,69 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Refluks, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bioprazol Bio Max to produkt leczniczy stosowany w celu zmniejszenia ilości kwasu żołądkowego wydzielanego w żołądku.

Wskazania

Bioprazol Bio Max jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.

Działanie

Omeprazol należy do grupy leków określanych mianem inhibitorów pompy protonowej, ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka wynosi: 1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.

Skład

1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.

Substancje pomocnicze: zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, dietylu ftalan, osłonka kapsułki: żelatyna, indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bioprazol Bio Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej,
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- biegunki,
- zaparcia,
- ból brzucha,
- wzdęcia,
- nudności lub wymioty,
- łagodne polipy żołądka.

Ostrzeżenia

- Bioprazol Bio Max może powodować utajenie objawów innych chorób.
- Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Bioprazol Bio Max.
- Bioprazol Bio Max zawiera sacharozę i laktozę bezwodną, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.