

Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek

Cena: 16,23 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BISACODYL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Bisacodyl VP to lek o działaniu przeczyszczającym i wiatropędnym. Jego aktywnym występowaniem jest bisakodyl (Bisacodylum), który działa na jelita grube, uderzenia i występc perystaltyczne. Dodatkowo bisakodyl pozwala na ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym. Lek jest stosowany w przypadku zaparć pochodzenia, włączając nawykowe, występujące u osób starszych, po zmianie diety oraz po operacjach. Bisacodyl VP może być także używany do opróżnienia piersi przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi, narzędziami jak rektoskopia, cholecystografia, urografia, rentgenodiagnostyka jamy brzusznej oraz zdjęcia radiologiczne stosowania łądzwiowo-krzyżowego kierownika.

Ten lek jest odpowiedni dla dzieci od 4 roku życia oraz dla osób dorosłych, w tym także tych w podeszłym wieku.

Wskazania

- Zaparcia różnego pochodzenia (np. nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne).
- Konieczność opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, uroografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka łądzwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 1-2 tabletki na noc.
- Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie, 1 tabletki na noc.

Skład

1 tabletki dojelitowa zawiera:

- substancję czynną: bisakodyl 5 mg.
- pozostałe składniki: rdzeń tabletki (skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna), otoczka (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Bisacodyl VP w przypadku wystąpienia:

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego),
- bólów brzucha o nieznannej etiologii z obecnością nudności i wymiotów,
- choroby Leśniowskiego-Crohna,
- wrzodziejącego zapalenie jelita grubego,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- ciężkiego odwodnienia.

Działania niepożądane

- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.
- bóle brzucha i biegunka.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających, oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej (w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
- Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.
- Nie stosować w bólach brzucha o nieznannej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.
- U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.
- Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.