


Calcium gluconicum, 50 tabletek



Cena: 20,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Niedobór minerałów, Osteoporoza, Pokrzywka, Uczulenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Calcium Gluconicum Farmapol to lek leczniczy, który jest polecany m.in. w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania na wapń, niedoboru tego minerału w organizmie, osteoporozie oraz w leczeniu złamań kości.

Wskazania

- stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie,
- stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej),
- leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo),
- teźyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in : bolesnymi skurczami mięśni, mrowieniem i drętwieniem palców u rąk i nóg),
- wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy),
- wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła),
- wspomagająco przy złamaniu kości, demineralizacji kości.

Działanie

Uzupełnia niedobory wapnia w organizmie, zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa przeciwobrzękowo, przeciwwysiękowo i przeciwalergiczo, stymuluje mechanizmy obronne organizmu.

Dawkowanie

Dorośli: stosować 1-2 tabletki 4 razy na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: jony wapnia 45 mg w postaci wapnia glukonianu 500 mg,
- pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol:

- w przypadku uczulenia na sole wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), np. z powodu nadczynności przytarczyc, nadmiaru witaminy D (hiperwitaminoza D), szpiczaka, przerzutów nowotworowych,
- jeśli pacjent ma ciężką postać hiperkalciurii, niewydolność nerek,
- w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy D.

Działania niepożądane

- wzdęcia, zaparcia, biegunka,

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli: pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, ma zaburzenia czynności nerek, choroby serca, sarkoidozę, kamicę nerkową.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C. w suchym miejscu.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań