

Calgel żel na dziąsła 10 g Inpharm-Import Równoległy



Cena: 23,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	CALGEL
Opakowanie	10 g (tuba)
Postać	Żel do stosowania na dziąsła
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Łagodzące (kojące), Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Calgel to preparat leczniczy o miejscowym działaniu w postaci żelu przeznaczonego do aplikacji na dziąsła. Jego skład obejmuje dwie aktywne substancje: lidokainę, która działa miejscowo jako środek znieczulający, oraz chlorek cetylopirydyniowy, który posiada ograniczone właściwości odkażające.

Zaleca się stosowanie żelu Calgel w przypadku stanów zapalnych towarzyszących ząbkowaniu u niemowląt od 3 miesiąca życia oraz starszych dzieci. Lek działa szybko, łagodząc lokalny ból związany z ząbkowaniem i redukując podrażnienie dziąseł.

Wskazania

Stany zapalne i ból wywołany ząbkowaniem u niemowląt od 3 miesiąca życia.

Działanie

Miejscowo znieczulające, łagodzące podrażnienia, odkażające.

Dawkowanie

Niemowlęta od 3 miesiąca życia: niewielką ilość żelu (pasek o długości 7,5 mm) wycisnąć na czubek czystego palca i delikatnie wcierać w dziąsła w miejscu wyrzynania się zębów.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancje czynne: lidokainy chlorowodorek 3,3 mg oraz 1 mg cetylopirydyniowy chlorek 1 mg,
- pozostałe składniki: sorbitol roztwór 70%, ksylitol, etanol 96%, glicerol, hydroksyetyloceluloza 5000, makrogloglicerolu hydroksystearnian, makroglueter laurylowy 9, makrogol 300, sacharyna sodowa, lewomentol, aromat ziołowy, karmel (E150), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie stosować leku Calgel u pacjentów z uczuleniem na chlorowoderek lidokainy, chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w tym rumianek.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: uczulenie (w tym zapalenie skóry), reakcje w miejscu podania (w tym rumień).

Ostrzeżenia

- Rumianek może wywoływać reakcje uczuleniowe. Nadwrażliwość na rumianek objawia się zazwyczaj utrudnionym oddychaniem lub reakcjami anafilaktycznymi występującymi po wypiciu ziołowego naparu zawierającego rumianek lub skórnymi reakcjami alergicznymi na preparaty zawierające rumianek.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 1 miesiąc.
- Lek Calgel zawiera sorbitol, etanol, sól.

Producent

MCNEIL C/O JOHNSON&JOHNSON