

Cefalgin, 10 tabletek

Cena: 11,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Migrena, Nerwoból
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cefalgin to produkt leczniczy do stosowania w bólach o słabym do umiarkowanego nasilenia oraz w gorączce.

Wskazania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle, gorączka.

Działanie

Cefalgin jest lekiem złożonym, zawierającym jako substancje czynne paracetamol i propyfenazon o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz małą dawkę kofeiny. Substancje czynne wchodzące w skład leku wspomagają wzajemnie swoje działanie. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Dawkowanie

Dorośli: jednorazowo 1-2 tabletki.

Skład

1 tabletkę zawiera: substancje czynne: paracetamol 250mg, propyfenazon 150mg, kofeinę 50mg; pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cefalgin:

- w przypadku nadwrażliwości na paracetamol, kofeinę, kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
- w przypadku nadwrażliwości na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol),
- jeśli pacjent choruje na: ciężką niewydolność wątroby i/lub nerek, nadciśnienie, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, chorobę alkoholową, ostrą porfirię wątrobową,
- jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, zmiany w obrazie krwi obwodowej

(niedokrwistość, agranulocytoza, leukopenia).

Działania niepożądane

- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych,
- zaburzenia nerek i dróg moczowych,
- rumień, wysypka, świąd, pokrzywka,
- nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie,

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku Cefalgin nie należy spożywać alkoholu.
- Lek należy stosować ostrożnie u osób starszych ze względu na obecność kofeiny.
- Nie stosować z innymi produktami zawierającymi paracetamol.
- Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzonej pracy wątroby i nerek.
- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku: niewydolności wątroby / nerek, zaburzeń hemopoezy, astmy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.