

# Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mg, 40 tabletek do ssania

Cena: 24,48 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CHLORCHINALDIN
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletka do ssania
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Chlorchinaldin** to środek antyseptyczny przeznaczony do leczenia infekcji jamy ustnej i gardła. Skuteczny w przypadku infekcji bakteryjnych i grzybiczych w obszarze dziąseł, jamy ustnej oraz gardła, w tym tzw. grzybicy poantybiotykowej.

### Wskazania

Do stosowania miejscowego: w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

### Działanie

Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe.

### Dawkowanie

Dorośli: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny.

### Skład

1 tabletkę do ssania zawiera:

- substancja czynna: chlorochinaldol 2 mg,
- pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki (zawierający m.in. glikol propylenowy (E1520), d-limonen, linalol), magnezu stearynian.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki:



- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

#### **Działania niepożądane**

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.
- Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

#### **Ostrzeżenia**

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

#### **Producent**

Bausch Health Ireland Limited  
Lake Drive Citywest Business  
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia