

Cholinex Pastyłki bez cukru 16 sztuk

Cena: 20,82 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Gardło
Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Cholinex
Opakowanie	16 pastylek
Postać	Pastyłki
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	, Ból gardła, Zapalenie
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Cholinex bez cukru to lek w postaci twardych pastylek do ssania, które zawierają 150 mg salicylanu choliny jako substancję czynną. Salicylan choliny należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek ten jest przeznaczony do stosowania w przypadku stanów zapalnych gardła i jamy ustnej. Działa miejscowo, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, jednocześnie zwiększając wydzielanie śliny.

Wskazania

Lek Cholinex bez cukru (150 mg) stosuje się u dzieci od 12 roku życia i osób dorosłych w leczeniu dolegliwości:

- stanów zapalnych błony śluzowej gardła i jamy ustnej,
- bólu i obrzęku gardła towarzyszącym stanom zapalnym,
- wspomagająco podczas antybiotykoterapii zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła, wywołanych przez niektóre drobnoustroje,
- stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia powstałych w wyniku leczenia stomatologicznego.

Działanie

Przeciwzapalne i przeciwbólowe, zmniejszające przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz zwiększające wydzielanie śliny.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej pastylce od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę).
- Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

- W przypadku pominięcia zastosowania leku należy kontynuować jego stosowanie, nie zwiększając następnej dawki.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

1 pastylka zawiera:

- substancje czynne: salicylan choliny 150 mg,
- substancje pomocnicze: izomalt, malitol ciekły, aspartam (E951), acesulfam potasowy, olejek miętowy.

Przeciwwskazania

- Uczulenia (nadwrażliwości) na salicylan choliny, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Obecności żylaków przełyku ze względu na ryzyko krwotoku.
- Fenyloketonurii, ponieważ produkt może zawierać fenyloalaninę.
- Nie zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Cholinex bez cukru może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta wystąpią. Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak zaczerwienienie skóry, wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu, oraz uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, które manifestuje się bólami brzucha, wymiotami i krwawieniami. Bardzo rzadko, u dzieci poniżej 12 roku życia po doustnym stosowaniu salicylanów, może wystąpić zespół Rey'a, który charakteryzuje się gwałtownymi obfitymi wymiotami, zaburzeniami świadomości, śpiączką z drgawkami, nieprawidłowym oddychaniem, obniżeniem stężenia cukru we krwi, sinicą, stłuszczeniem i powiększeniem wątroby.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, zarówno na receptę, jak i bez recepty, w tym również o ostatnio stosowanych. Istnieje niewielka możliwość, że salicylan choliny zawarty w leku może wpływać na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, osłabiając ich działanie. Ponadto, może nasilać działanie leków uspokajających, nasennych, przeciwcukrzycowych i przeciwzakrzepowych. Istnieje także ryzyko zwiększenia krwawień po podaniu Cholinexu w połączeniu ze steroidowymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwzakrzepowymi, fibrynolitycznymi (rozpuszczającymi skrzepy) lub lekami hamującymi agregację płytek krwi (zlepianie się płytek krwi).

Ostrzeżenia

U dzieci w wieku do 12 lat stosowanie leku Cholinex powinno być zdecydowane przez lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Przed zastosowaniem leku, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w przypadku pacjenta, który ma stany zapalne przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz astmę oskrzelową.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Cholinex. W przypadku prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie ma wpływu leku na zdolność wykonywania tych czynności.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

