

Coldrex Junior C 300 mg + 20 mg +5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla dzieci 6-12 lat, smak cytrynowy, 10 saszetek



Cena: 27,57 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	COLDREX
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Coldrex Junior C to preparat w postaci proszku do rozpuszczania w wodzie, który skutecznie łagodzi objawy przeziębienia i grypy u dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwwirusowo. Objawy infekcji, takie jak gorączka, bóle mięśni, ból gardła, kaszel czy katar, mogą być różnorodnie i dokuczliwe dla dziecka. Dzięki swojemu unikalnemu składowi, Coldrex Junior C zawiera paracetamol, chlorowodorek fenylefryny oraz witaminę C w postaci kwasu askorbowego, co sprawia, że preparat efektywnie łagodzi dolegliwości przeziębienia i grypy, pomagając dziecku szybciej powrócić do zdrowia.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katar) u dzieci w wieku 6-12 lat.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udroźniające nos i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszетка co 4 godziny, nie więcej niż 4 razy na dobę.

Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 300 mg, chlorowodorek fenylefryny 5 mg, kwas askorbowy 20 mg,



- pozostałe składniki: sacharyna sodowa, sodu cyklamianian, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat cytrynowy PHS-163671, kurkumina (E100).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Coldrex Junior C

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek,
- jeśli pacjent przyjmuje zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV),
- w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania.

Działania niepożądane

Coldrex Junior C może powodować następujące działania niepożądane:

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zwiększenie ciśnienia tętniczego,
- nudności i wymioty.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1 saszetka zawiera 1,9 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie.
- Lek zawiera paracetamol - nie należy łączyć go z innymi lekami z paracetamolem.

Producent

Perrigo Poland sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-633 Warszawa