


# Contrahist Allergy 5 mg, 10 tabletek

Cena: 10,11 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CONTRAHIST
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Contrahist Allergy 5 mg** wskazany jest do stosowania dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6. roku życia w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błon śluzowych nosa.

### Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 tabletkę (5 mg) na dobę.

### Skład

1 tabletkę powlekana zawiera:

- substancję czynną: lewocetyryzyny chlorowodorek 5 mg, co odpowiada lewocetyryzynie 4,2 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek przeciwalergiczny lub na którykolwiek z

pozostałych składników tego leku,

- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10ml/min),
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

#### Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- suchość w jamie ustnej,
- bóle głowy,
- zmęczenie, senność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- uczucie wyczerpania,
- bóle brzucha.

#### Ostrzeżenia

- Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku zaburzeń czynności nerek, trudności z oddawaniem moczu.
- Lek może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych. Lek należy odstawić na 3 dni przed takim testem.
- Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
- Nie należy łączyć leku z alkoholem.
- Lek zawiera laktozę.

#### Producent

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów