

Contril syrop 60 mg/10ml 120 ml



Cena: 22,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CONTRIL
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Contril to lek przeciwkaszlowy o smaku wiśniowym, który jest przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia oraz dla dorosłych. Stosuje się go doustnie w leczeniu suchego, nieproduktywnego kaszlu, który może towarzyszyć zakażeniom górnych lub dolnych dróg oddechowych, w tym także krztuścowi

Wskazania

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Działanie

Przeciwkaszlowe, znoszące skurcz oskrzeli.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 10-20 kg: 3 ml maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 21-30 kg: 5 ml maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dorośli: 10 ml maksymalnie 3 razy na dobę.

Skład

10 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: lewodropropizynę (Levodropropizynum) 60 mg,
- substancje pomocnicze: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, aromat wiśniowy 0527477 (zawiera m.in. glikol propylenowy), sodu wodorotlenek, roztwór 10%, kwas cytrynowy jednowodny, roztwór 10%, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Contril w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników. Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek oraz u szczególnie wrażliwych osób stosujących leki uspokajające.
- Leki przeciwkaszlowe to leki objawowe i można je stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.
- Kaszel utrzymujący się powyżej 7 dni wymaga konsultacji z lekarzem.
- Lek zawiera sacharozę.
- Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesany, które mogą powodować reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.
- Produkt leczniczy zawiera 7,5 mg glikolu propylenowego w 10 ml syropu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław