

Controloc Control 20 mg, 14 tabletek

Cena: 15,04 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CONTROLLOC
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	TAKEDA GMBH (KONSTANZ)
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Controloc Control to lek stosowany w krótkotrwałym leczeniu choroby refluksowej przełyku. Refluks polega na cofaniu się kwasu żołądkowego do przełyku, co może powodować stan zapalny przełyku i objawy takie jak pieczenie, zgaga oraz kwaśne odbijanie. Substancją czynną w tym leku jest pantoprazol, który działa poprzez blokowanie enzymów odpowiedzialnych za produkcję kwasu żołądkowego. Dzięki temu działaniu, Controloc Control zmniejsza ilość wydzielanego kwasu żołądkowego, co pomaga łagodzić objawy refluksu przełyku i przyspiesza proces gojenia stanu zapalnego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u osób dorosłych.

Działanie

Pantoprazol blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- Substancja czynna: pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego) 20 mg;
- Substancje pomocnicze: rdzeń (sodu węglan bezwodny, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian), otoczka (hypromeloza, powidon, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian), tusz (szelak, czerwony, czarny i żelaza tlenek żółty (E172) i amonowy wodorotlenek stężony).

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Controloc Control:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane

- łagodne polipy żołądka.
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,
- zaparcia,

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.