

Dektac 25 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 29,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Dektac to lek przeciwbólowy dostępny w postaci tabletek powlekanych. Jest przeznaczony do łagodzenia bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego u osób dorosłych, które ukończyły 18 lat.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśni i stawów, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: deksketoprofen (25 mg), w postaci 36,90 mg deksketoprofenu z trometamolem.
- pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), glicerolu distearynian, otoczka tabletki (Opadry Y1-7000): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol/ PEG 400.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Dektac w przypadku:

- uczulenia na deksketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy albo inne NLPZ;
- osób chorujących obecnie albo w przeszłości na astmę, ostry alergiczny nieżyt nosa, polipy nosa, pokrzywkę, obrzęk

- naczynioruchowy, świszczący oddech po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego czy innego NLPZ;
- pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na światło, reakcje fotoalergiczne czy fototoksyczne w czasie przyjmowania ketoprofenu albo fibratów;
 - osób z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawieniem z żołądka albo jelit, owrzodzeniami czy perforacją, szczególnie jeśli występowały one po zastosowaniu NLPZ;
 - pacjentów z chorobami jelit przebiegającymi z przewlekłym stanem zapalnym, ciężką niewydolnością serca, umiarkowanymi albo ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ciężkimi zaburzeniami wątroby;
 - pacjentów z nadmierną skłonnością do krwawień czy zaburzeń krzepnięcia, ciężko odwodnionych.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane: Nudności i (lub) wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność (dyspepsja).
- Niezbyt często występujące działania niepożądane: Uczucie wirowania, zawroty głowy, senność, zaburzenia snu, nerwowość, bóle głowy, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia żołądkowe, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów, wysypka, zmęczenie, ból, odczuwanie gorączki i dreszczy, złe samopoczucie.
- Rzadko występujące działania niepożądane: Choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja wrzodu trawiennego, które może objawiać się krwawymi wymiotami lub czarnymi stolcami, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zwolnienie częstości oddechów, gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe (np. spuchnięte kostki), obrzęk gardła, utrata apetytu (jadłowstręt) (jadłowstręt), nieprawidłowe czucie, swędząca wysypka, trądzik, zwiększona potliwość, ból pleców, zwiększone oddawanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego, nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby (testy krwi), uszkodzenie komórek wątroby (zapalenie wątroby), ostra niewydolność nerek.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: Reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego), owrzodzenie skóry, warg, oczu i okolic narządów płciowych (zespół Stevensa Johnsona i zespół Lyella), obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy), duszność spowodowana skurczem mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli), krótki oddech, przyspieszony rytm serca, obniżone ciśnienie krwi, zapalenie trzustki, nieostre widzenie, szumy uszne, reakcje nadwrażliwości skóry i nadwrażliwość skóry na światło, świąd, zaburzenia czynności nerek, zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów z: alergią; zaburzeniami czynności nerek, wątroby, serca, zatrzymywanie płynów; obniżonym nawodnieniem, zmniejszoną objętością krwi; chorobami serca, po udarze, z podwyższonym ciśnieniem krwi, cukrzycą, podwyższonym stężeniem cholesterolu, palących tytoń; podeszłym wieku; zaburzeniami tworzenia krwi albo komórek krwi; toczeniem rumieniowatym układowym, mieszanymi chorobami tkanki łącznej; inne choroby żołądka albo jelit; ospą wietrzną.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Blistry należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Producent

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice