

# Denicit 1,5mg, 100 tabletek

Cena: 24,96 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

**Denicit** to lek w postaci tabletek przeznaczony dla osób dorosłych, które pragną rzucić palenie. Głównym składnikiem aktywnym jest cytyzyna, która działa podobnie do nikotyny, lecz nie wywołuje efektu uzależnienia.

Stosowanie leku Denicit ma na celu wspieranie procesu odzwyczajania się od palenia tytoniu poprzez zmniejszenie uczucia głodu nikotynowego. Jego działanie ma na celu trwałe przerwanie używania produktów zawierających nikotynę.

### Wskazania

Odzwyczajanie się od palenia tytoniu i zmniejszenie głodu nikotynowego.

### Działanie

Zmniejszenie głodu nikotynowego.

### Dawkowanie

- Od 1. do 3. dnia terapii: 1 tabletkę co 2 godziny, maksymalna dawka dobową 6 tabletek.
- Od 4. do 12. dnia terapii: 1 tabletkę co 2,5 godziny, maksymalna dawka dobową 5 tabletek.
- Od 13. do 16. dnia terapii: 1 tabletkę co 3 godziny, maksymalna dawka dobową 4 tabletki.
- Od 17. do 20. dnia terapii: 1 tabletkę co 5 godzin, maksymalna dawka dobową 3 tabletki.
- Od 21. do 25. dnia terapii: 1-2 tabletki na dobę, maksymalna dawka dobową 2 tabletki.

### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: cytyzyna 1,5 mg,
- substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia ziemniaczana, skrobia żelowana kukurydziana, talk, wapnia fosforan, Opadry AMB II 88A265001 brown.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent: ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma niestabilną dławicę piersiową niedawno przebył zawał serca; niedawno przebył udar mózgu; jest w ciąży i karmi piersią.

### Działania niepożądane

Bardzo częste :

- zmiana apetytu (głównie zwiększenie),
- przyrost masy ciała,
- rozdrażnianie, zmiany nastroju, lęk,
- podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie),
- suchość w jamie ustnej,
- zaburzenia snu (bezsenna, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary),
- bóle głowy, przyspieszenie akcji serca, nudności, bóle brzucha (szczególnie w nadbrzuszu),
- bóle mięśniowe.

Częste :

- zawroty głowy,
- trudności w koncentracji,
- zwolnienie akcji serca,
- wzdęcia,
- zmiany smaku,
- zgaga,
- zaparcie,
- wymioty,
- pieczenie języka,
- biegunka,
- wysypka,
- wzmożona męczliwość, złe samopoczucie.

Niezbyt częste :

- uczucie ciężkości głowy,
- osłabienie popędu płciowego,
- łzawienie oczu,
- duszność,
- wzmożone odkrztuszanie,
- nadmierne ślinienie,
- wzmożona potliwość,
- zmniejszenie elastyczności skóry,
- zmęczenie,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

### Ostrzeżenia

- Lek Denicit należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic i innych chorób obwodowych naczyń krwionośnych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.
- Lek powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu.
- Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

### Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala I  
21-003 Ciecierzyn