

Desmoxan Tabletki 100 sztuk

Cena: 88,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DESMOXAN
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Palenie, Uzależnienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Desmoxan to kuracja stworzona z myślą o osobie, która wykorzystuje narzędzie do palenia tytoniu. Składająca się z cytyzyny, główna funkcja dostępna, leczenie ta działa poprzez wypieranie nikotyny z organizmu. W końcu, kończy się uzależnieniem od nikotyny i ułatwianiem odzwyczajania się od palenia palenia. Oprócz tego Desmoxan łagodzi skutki, takie jak niepokój czy irytacja, oraz zmniejsza uciążliwość głód nikotynowy. Dzięki tej osobie, osoby z tej terapii mogą skutecznie rzucić palenie w trakcie leczenia. Jeden zestaw Desmoxan zawiera 100 tabletek i wystarczy na pełną, 25-dniową zawartość.

Wskazania

Dla osób, które chcą przestać palić w celu odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego.

Działanie

Łagodzi objawy związane z odstawieniem nikotyny.

Dawkowanie

Desmoxan należy przyjmować zgodnie z poniższym schematem:

- od 1. do 3. dnia: 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek dziennie),
- od 4. do 12. dnia: 1 tabletkę co 2,5 godziny (5 tabletek dziennie),
- od 13. do 16. dnia: 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki dziennie),
- od 17. do 20. dnia: 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki dziennie),
- od 21. do 25. dnia: 1-2 tabletki na dobę (do 2 tabletek dziennie).

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: cytyzyna 1,5 mg,

- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.
- skład kapsułki twardej: tytanu dwutlenek, indygotyna, żelatyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Desmoxan?

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
- w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu,
- w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca.

Działania niepożądane

Zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, zawroty głowy, rozdrażnienie, zmiany nastroju, lęk, podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), suchość w jamie ustnej, biegunka, wysypka, wzmożona męczliwość, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), Bóle głowy, przyspieszenie akcji serca, nudności, zmiany smaku, zgaga, zaparcie, wymioty, bóle brzucha (szczególnie w nadbrzuszu), bóle mięśniowe.

Ostrzeżenia

Desmoxan powinien być stosowany tylko przez pacjentów, którzy mają poważny zamiar rzucenia palenia tytoniu. Stosowanie leku Desmoxan i palenie tytoniu może doprowadzić do nasilenia niepożądanych działań nikotyny.

W przypadku występowania następujących chorób:

- choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń mózgowych, zaburzenia drożności tętnic, nadciśnienie tętnicze,
- guz chromochłonny nadnerczy,
- chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku,
- nadczynność tarczycy,
- cukrzyca,
- niektóre postaci schizofrenii,
- niewydolność nerek i wątroby; - jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133
95-200 Pabianice

Galeria

