

Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego, 20 saszetek

Cena: 22,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DEXAK
Opakowanie	20 saszetek
Postać	granulki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Dexak SL to dostępny bez recepty lek przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego łagodzenia ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu. Każda saszетка zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem w postaci granulatu do przygotowania roztworu doustnego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśni i stawów, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka wynosi 1 saszетка (25 mg) co 8 godzin, co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Skład

1 saszетка granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera:

- substancja czynna: deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem,
- substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydyndy-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy, sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dexak SL:

- jeśli pacjent ma uczulenia na deksketoprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeżeli u pacjenta występują przewlekłe problemy trawienne,
- jeżeli pacjent jest w stanie ciężkiego odwodnienia z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającej ilości przyjętych płynów.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- nudności i (lub) wymioty
- bóle brzucha,
- biegunka,
- niestrawność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- zawroty głowy,
- senność,
- zaburzenia snu,
- nerwowość,
- bóle głowy,
- kołatanie serca,
- zaczerwienienie twarzy,
- wzdęcia,
- wysypka,
- zmęczenie,
- odczuwanie gorączki i dreszczy,
- złe samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane:

- choroba wrzodowa żołądka,
- omdlenia,
- nadciśnienie tętnicze,
- gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe,
- utrata apetytu,
- zwiększone pocenie się,
- ból pleców,
- zwiększone oddawanie moczu,
- zaburzenia miesiączkowania.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

- owrzodzenia skóry, ust, oczu i okolic narządów płciowych,
- obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła,
- duszność spowodowana zęženiem dróg oddechowych,
- obniżone ciśnienie krwi,
- reakcje nadwrażliwości skóry,
- swędzenie,
- nadwrażliwość skóry na światło.

Ostrzeżenia

- Lek Dexak SL zawiera sacharozę.
- Jeśli u pacjenta występuje alergia lub jeśli u pacjenta występowały problemy z alergią w przeszłości, powinni przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca jak również zatrzymywanie płynów, powinni przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Jeżeli u pacjenta występują lub występowały inne choroby żołądka lub jelit, powinnien przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa