

Dexak SL 25 mg x 20 sasz. (Import równoległy)



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 sasz.
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Dexak SL - produkt leczniczy stosowany do krótkotrwałego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Wskazania

Leczenie tymczasowe, mające na celu złagodzenie ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, takiego jak ból mięśniowo-kostny, bolesne miesiączkowanie lub ból zębów.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dla dorosłych, zalecana dawka leku, w zależności od rodzaju i nasilenia bólu, wynosi 12,5 mg co 4-6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Należy przyjmować lek doustnie, co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Ważne jest, aby nie przekraczać całkowitej dziennej dawki 75 mg deksketoprofenu. Aby przygotować roztwór, należy rozpuścić zawartość saszetki w 250 ml wody i dokładnie wymieszać. Następnie należy wypić przygotowany roztwór natychmiast po przygotowaniu.

Skład

1 saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem oraz substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydyno-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy, sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną. Każda saszetka zawiera 2,5g sacharozy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość: Nie należy stosować leku Dexak u pacjentów, którzy są nadwrażliwi na deksketoprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub jakąkolwiek substancję pomocniczą obecną w preparacie.
- Astma i reakcje alergiczne: Pacjenci, u których substancje o podobnym mechanizmie działania, takie jak kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, wywołują napady astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa, polipy nosa, pokrzywkę lub obrzęk naczyń ruchomych, również nie powinni stosować leku Dexak.
- Choroba wrzodowa i krwawienie: Osoby z aktywną chorobą wrzodową żołądka, krwawieniami z przewodu pokarmowego lub perforacją związaną z wcześniejszym leczeniem NLPZ, nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem, jak również pacjenci z krwawieniami z przewodu pokarmowego lub innymi czynnymi krwawieniami, powinni unikać stosowania leku Dexak.

Inne stany chorobowe: Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, astmą oskrzelową, ciężką



niewydolnością serca, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, skazą krwotoczną, zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz kobiety w trzecim trymestrze ciąży i okresie laktacji również nie powinny stosować leku Dexak.

- Dzieci i młodzież: Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, lek Dexak nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Uwagi
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.