

Dicopeg Junior Free, 14 saszetek

Cena: 35,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DICOPEG
Opakowanie	14 saszetek po 5 g
Postać	Proszek
Producent	VITIS PHARMA
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Dicopeg Junior Free to produkt medyczny o działaniu osmotycznym, który jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior Free zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnienie, przy czym nie wywołuje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność produktu nie zmniejsza się z upływem czasu. Nie jest wchłaniany ani nie ulega fermentacji w jelitach, co oznacza, że nie podrażnia błony śluzowej i jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Składniki

1 saszетка (5g) zawiera: 5g makroglu 3350.

Zastosowanie

Do stosowania w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit.

Sposób użycia

- Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia. W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem. Podawać małym dzieciom tylko w oparciu o wskazania lekarza.
- Od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1-2 saszetki dziennie
- Od 2. do 11. roku życia (od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki dziennie
- Powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg): 2-6 saszetek dziennie
- Rozpuścić saszetkę (5 g) w ok. 62,5 ml wody lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe.
- Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości płynu i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny.



- Maksymalna konieczna dzienna dawka zazwyczaj nie przekracza 30 g produktu na dobę (6 saszetek).

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol.
- Nie stosować w przypadku: perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wzdalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniewskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25oC.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

SIIT
Via Ariosto 50/60
Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy