

Dicostop płyn, 10 saszetek



Cena: 18,85 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DicoSTOP
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Płyn
Producent	VITIS PHARMA
Przeznaczenie	Ochronne, Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Diosmektyt to naturalna glina o strukturze cienkich nakładających się na siebie krystalicznych płytek. Charakteryzuje się dużą zdolnością chłonną, co umożliwia absorpcję płynów, bakterii i wirusów obecnych w świetle jelita. Działanie Diosmektytu, zawartego w preparacie DICOSTOP, polega na zagęszczaniu konsystencji stolca oraz spowalnianiu procesu wydalania. Substancja ta łączy się z glikoproteinami warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego, zmieniając ich fizyczną charakterystykę. Tworzy chłonny żel, który skutecznie chroni przed nadmiernym wydzielaniem kwasu i substancjami drażniącymi żołądek, jednocześnie stanowi barierę przeciwko mechanizmom zapalnym.

Składniki

Składnik aktywny: diosmektyt (1,5 g), substancje pomocnicze: woda oczyszczona, EDTA, guma karaya, metyloparaben sodowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kwas cytrynowy, benzoesan sodowy, sukraloza.

Zastosowanie

Doustne leczenie ostrych i przewlekłych biegunek, dolegliwości bólowych związanych z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego.

Sposób użycia

- Dzieci w wieku 2-6 lat: 1 saszетка 1-2 razy dziennie.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszетка 2-3 razy dziennie.
- Dorośli: 1 saszетка 3 razy dziennie

Przeciwwskazania

- Nie stosować wyrobu medycznego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia.



- Nie stosować wyrobu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki tego wyrobu medycznego.
- Nie stosować wyrobu medycznego u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Energicznie ugnieść saszetkę przed użyciem.
- Nie stosować dłużej niż 10 kolejnych dni. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli u dzieci biegunka utrzymuje się przez dłużej niż 3 dni, należy zwrócić się po poradę medyczną.

Producent

Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa