

## DobenoX 30 tabletek



Cena: 12,27 zł

### Opis słownikowy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                         |
| Marka           | DOBENOX  |
| Opakowanie      | 30 tabletek                                      |
| Postać          | Tabletka   |
| Producent       | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Przeznaczenie   | Hemoroidy, Obrzęk, Zakrzepy, Żylaki              |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                  |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat           |

### Opis produktu

#### Opis

**DobenoX** to lek stosowany w celu usprawnienia przepływu żylnego. Lek zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych oraz zmniejsza lepkość osocza.

#### Wskazania

Objawowe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych. Objawowe leczenie żylaków odbytu.

#### Działanie

Wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylnie i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastoju i zakrzepów w naczyniach żylnych.

#### Dawkowanie

- Niewydolność żylna - 2 tabletki 1-2 razy na dobę,
- Żylaki odbytu - 2 tabletki 1-2 razy na dobę.

#### Skład

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, 1 tabletka zawiera 250mg wapnia dobezylanu jednowodnego, pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

#### Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.



### Działania niepożądane

- nudności, biegunka,
- odczyny skórne,
- bóle stawów.

### Ostrzeżenia

- Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.
- Lek zawiera laktozę.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.