

# Duphalac Fruit syrop, 500ml



Cena: 37,53 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DUPHALAC
Opakowanie	500 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Duphalac Fruit** to lek, który działa jako środek zmiękczający stolec i ułatwia jego przemieszczanie się przez jelito poprzez zatrzymywanie wody w jelicie. Substancją czynną leku jest laktuloza, która jest środkiem przeczyszczającym.

### Wskazania

Objawowe leczenie zaparc (stolec twardy i suchy, rzadkie opróżnienia) oraz zmiękczenia stolca:

- w przypadku hemoroidów (żylaki odbytu),
- po operacjach odbytu i jelita grubego.

### Działanie

Zmiękcza stolec i ułatwia jego przemieszczanie powodując przenikanie wody do jelita. Nie jest wchłaniana do organizmu.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież: 15-45ml.
- Dzieci (7-14 lat): 15ml.
- Dzieci (1-6 lat): 5-10ml.
- Niemowlęta poniżej 1 roku: do 5ml.

### Skład

1ml leku zawiera:

- substancja czynna: 667 mg laktulozy,
- pozostałe składniki to: aromat śliwkowy. Lek może zawierać bardzo małe ilości innych cukrów takich jak laktoza, galaktoza,

epilaktoza i fruktoza.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Duphalac Fruit:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na laktulozę lub pozostały składnik tego leku,
- jeśli pacjent cierpi na: galaktozemię, niedrożność przewodu pokarmowego (oprócz zaparć), perforację przewodu pokarmowego lub ryzyko jej wystąpienia (np. w chorobie Crohna, wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy).

#### Działania niepożądane

- biegunka.
- wzdęcia (powiększenie obwodu brzucha),
- nudności (mdłości),
- wymioty,
- ból brzucha.

#### Ostrzeżenia

- Pacjenci z zespołem Roemhelda: jeśli pacjent ma wzdęcia oraz wiatry po zastosowaniu leku należy przerwać leczenie i poradzić się lekarza.
- Duphalac Fruit może zaburzać normalny rytm oddawania stolca.
- Stosowanie przewlekłe nieodpowiedniej dawki (więcej niż 2-3 wypróżnienia na dobę) lub nieodpowiednie użycie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej.
- Nie należy stosować leku Duphalac Fruit dłużej niż dwa tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
- W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 2 l/dzień, tj. 6-8 szklanek).

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.