

Echinerba 100 mg, 30 tabletek



Cena: 24,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ECHINERBA
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Przeznaczenie	Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Echinerba to konwencjonalny produkt ziołowy w postaci tabletek, wykorzystywany w celu wzmacniania odporności podczas przeziębienia. Preparat jest odpowiedni dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12 lat. Głównym składnikiem aktywnym jest ekstrakt suchy z ziela jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae herbae extractum siccum*). Echinerba jest lekiem tradycyjnym, co oznacza, że jego efektywność w wymienionych zastosowaniach bazuje na długotrwałym stosowaniu i zdobywanym doświadczeniu.

Wskazania

Lek Echinerba 100 mg stosuje się u osób powyżej 12. roku życia:

- tradycyjnie jako lek pomocniczy w chorobach przeziębieniowych.

Działanie

Echinerba to ziołowy lek wspomagający odporność, który tradycyjnie stosuje się w przeziębieniu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletkę 3 razy na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: wyciąg suchy z ziela jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae herbae extractum siccum*) 100 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, krzem dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania



Nie zaleca się używania tego preparatu w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny złożonych Compositae, chorób takich jak gruźlica, zakażenia wirusem HIV lub AIDS, białaczki, a także schorzeń autoimmunologicznych, jak stwardnienie rozsiane i choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy). Nie jest również wskazane stosowanie produktu w przypadku obniżonej odporności organizmu, takiej jak po terapii lekami onkologicznymi, po przeszczepie organów lub szpiku kostnego.

Działania niepożądane

- wysypkę, pokrzywkę,
- zespół Stevensa-Johnsona,
- obrzęk Quincke'go,
- skurcz oskrzeli, astmę,
- wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

Okres przyjmowania leku nie powinien przekroczyć 10 dni. Jeśli po tym czasie objawy nie wykazują poprawy lub stan pacjenta pogorszył się, zaleca się skonsultowanie dalszych kroków z lekarzem. Jeśli występuje gorączka, zalecane jest konsultowanie się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku, gdy pacjent ma potwierdzone rozpoznanie alergii (wziewnej, skórnej lub pokarmowej).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.