

Efferalgan Vitamin C tabl.mus. 20 tabletek

Cena: 15,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Ból, Gorączka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Efferalgan Vitamin C jest produktem leczniczym w postaci tabletek musujących stosowanym w bólu i gorączce.

Wskazania

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania sprayu do nosa. Ze względów higienicznych zaleca się, aby butelka sprayu była używana przez jedną osobę, aby uniknąć ewentualnego przeniesienia zakażenia lub infekcji.

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): doustnie 1-2 tabletki rozpuszczone w szklance wody, nie częściej niż co 4 godziny.

Bezwzględnie nie przekraczać maksymalnej dziennej dawki 12 tabletek na dobę.

Dzieci o masie ciała 27 do 33 kg (od 8 do 12 lat*): doustnie 1 tabletkę rozpuszczoną w szklance wody, można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny. Maksymalnie 6 tabletek na dobę.

Dzieci o masie ciała 33 do 50 kg (od 12 do 15 lat*): 1 - 2 tabletki rozpuszczona w szklance wody, można powtarzać co 6 godzin. Maksymalnie 8 tabletek na dobę.

Skład

1 tabletkę musującą zawiera: 330mg paracetamolu i 200mg kwasu askorbinowego. Inne składniki leku: potasu wodorowęglan, sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoosan, sodu dokuzynian, powidon.

Przeciwwskazania

Efferalgan Vitamina C jest przeciwwskazany w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:

- Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kwas askorbinowy (witamina C) lub inne składniki leku.



- U dzieci o masie ciała poniżej 27 kg.
- U kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.
- W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
- W przypadku choroby alkoholowej.
- W przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
- Podczas leczenia inhibitorami MAO (monoaminooksydazą) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu takiego leczenia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.