

# Emla plaster (25mg+25mg) 2 plastry

Cena: 44,92 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	2 sztuki
Postać	plaster
Producent	ASPEN PHARMA TRADING LTD.
Przeznaczenie	Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Emla plaster 25 mg + 25 mg** to produkt leczniczy wykorzystywany do miejscowego znieczulenia skóry przed podaniem zastrzyków, pobraniem krwi do badań czy drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Zawiera dwie substancje czynne, lidokainę i prilokainę, które działają miejscowo i krótkotrwale, eliminując czucie w powierzchownych warstwach skóry. Plaster Emla zapewnia komfort pacjentom podczas różnych procedur medycznych. Może być stosowany zarówno u dzieci, w tym noworodków i niemowląt, jak i u dorosłych. Skład produktu obejmuje część plastra nakładaną na skórę oraz folię ochronną. Klej akrylowy na jasnobieżowej części plastra zapewnia przyleganie do skóry. Centralna część plastra zawiera biały krążek nawilżony emulsją, która zawiera substancje czynne i pomocnicze. Opakowanie produktu zawiera 2 plastry, zabezpieczone z jednej strony folią aluminiową.

### Wskazania

Emla Plaster jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w celu miejscowego znieczulenia skóry przed:

- włknięciem igły (np. przed wykonaniem zastrzyku lub pobraniem krwi do badań),
- drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze.

### Działanie

- Emla Plaster zawiera dwie substancje miejscowo znieczulające – lidokainę i prylokainę. Jest stosowany miejscowo w celu uzyskania przemijającego znieczulenia skóry.
- Znieczulenie to może być odczuwane jako zdrętwienie. W miejscu znieczulonym można odczuwać dotyk lub ucisk.

### Dawkowanie

- Stosowanie na skórę przed drobnymi zabiegami (np. włknięcie igły lub drobne zabiegi chirurgiczne na skórze): Czas stosowania: w przybliżeniu 1 godzina.
- Noworodki i niemowlęta w wieku od 0 do 2 miesięcy: jeden plaster stosuje się na wybrany obszar skóry. Czas stosowania: 1 godzina, nie dłużej. Tylko jedna dawka pojedyncza powinna być stosowana w dowolnym okresie 24-godzinnym. Rozmiar plastra

czyni go mniej przydatnym do stosowania na niektórych częściach ciała noworodków i niemowląt.

- Niemowlęta w wieku od 3 do 11 miesięcy: do 2 plastrów stosuje się na wybrany obszar skóry. Czas stosowania: w przybliżeniu 1 godzina.
- Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: do 10 plastrów stosuje się na wybrany obszar skóry. Czas stosowania: w przybliżeniu 1 godzina, maksymalnie 5 godzin.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: do 20 plastrów stosuje się na wybrany obszar skóry. Czas stosowania: w przybliżeniu 1 godzina, maksymalnie 5 godzin.
- U dzieci w wieku powyżej 3. miesięcy: w dowolnym okresie 24-godzinnym można stosować maksymalnie 2 dawki (jak podano powyżej), w odstępach co najmniej 12-godzinnych.

#### Skład

1 plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm<sup>2</sup> zawiera:

- substancje czynne: lidokainę 25 mg, prylokainę 25 mg,
- substancje pomocnicze: makrogolglicerolu hydroksystearnian, karboksypolimetylen (Carbopol 974P), wodorotlenek sodu do uzyskania pH od 8,7 do 9,7, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Plastrów Emla:

- Nadwrażliwość na lidokainę lub prylokainę lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej albo na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Leku EMLA PLASTER nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy życia, które są leczone jednocześnie innymi lekami, które wpływają na barwnik krwi i mogą powodować methemoglobinemię (np. sulfonamidami).
- Leku nie należy stosować u noworodków urodzonych przedwcześnie.

#### Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku EMLA PLASTER należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma rzadko występujące zaburzenie metaboliczne, które wpływa na krew i nazywane jest „niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej”,
- jeżeli u pacjenta występuje problem związany ze stężeniem barwnika krwi, zwany „methemoglobinemią”,
- nie należy stosować leku EMLA PLASTER na obszary skóry z wysypką, skaleczeniami, zadrapaniami lub innymi otwartymi ranami. W przypadku występowania u pacjenta którychkolwiek z tych zmian, przed użyciem plastra należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą,
- jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie ze świądem skóry zwane „atopowym zapaleniem skóry”, wystarczające może być użycie plastra przez krótszy czas.
- Należy unikać kontaktu leku EMLA PLASTER z oczami, ponieważ może on powodować ich podrażnienie.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

#### Producent

ASTRAZENECA  
Postępu 18  
Warszawa