

Enterol 250 mg, 10 kapsułek



Cena: 27,53 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ENTEROL
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki
Przeznaczenie	Biegunka, Odbudowa flory bakteryjnej
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis
Enterol 250 to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym zawierającym drożdżaki *Saccharomyces boulardii*.

Wskazania
Lek Enterol do stosowania doustnego jest stosowany w:

- leczeniu ostrej biegunki infekcyjnych,
- zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym,
- nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem,
- zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym,
- zapobieganiu biegunkom podróżnych.

Działanie
Enterol wpływa na florę jelitową, jest tzw. "substytutem naturalnej flory", który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia.

Dawkowanie
Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci:

- ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia,
- biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*: 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni,
- biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę,
- biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia,
- biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie stosowania antybiotyku i około 7 dni po antybiotykoterapii

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* (250 mg),
- substancje pomocnicze: laktozę jednowodną (32,5 mg), stearynian magnezu. W skład kapsułki żelatynowej wchodzi żelatyna i dwutlenek tytanu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Enterol 250:

- jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej,
- u pacjentów w stanie krytycznym lub u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii.

Działania niepożądane

- wzdęcia.
- wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd,
- reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy,
- wysypka na całym ciele (osutka).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę - nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly, Francja