

## Esberitox N 100 tabletek



Cena: 55,83 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ESBERITOX N
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Infekcja, Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Esberitox N** to ziołowy lek w formie okrągłych, beżowo-brązowych tabletek, przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci od 4 roku życia. Produkt leczniczy składa się z wyciągu z zieleń żywotnika zachodniego (*Thujae occidentalis herba*), korzenia jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae radice*) oraz korzenia dzikiego indygo (*Baptisiae tinctoriae radice*).

#### Wskazania

Lek Esberitox N stosuje się:

- w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający oraz skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

#### Działanie

Stymulacja układu immunologicznego.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.

#### Skład

1 tabletkę leku zawiera:

- substancje czynne: 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: *Baptisiae tinctoriae radice* (korzeń dzikiego indygo) 10 mg, *Echinaceae purpureae radice* (korzeń jeżówki purpurowej) 7,5 mg, *Thujae occidentalis herba* (zieleń żywotnika zachodniego) 2 mg, ekstrahent: etanol 30% (v/v);
- substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

### Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na ziele żywotnika zachodniego, korzeń jeżówki purpurowej, korzeń dzikiego indygo lub na rośliny pokrewne jeżówce, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne,
- w przypadku immunosupresji,
- u dzieci poniżej 4 lat.

### Działania niepożądane

- wysypkę na skórze,
- świąd (swędzenie),
- obrzęk (opuchlizna) twarzy,
- duszności,
- zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi.

### Ostrzeżenia

- Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.