

Famotydyzna Ranigast 20 mg x 20 tabl. powl.

Cena: 18,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.



Opis produktu

Składniki

Famotidine

Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Leczenie antagonistami receptora histaminowego H₂, w tym m.in. famotydyną, może maskować objawy raka żołądka i opóźnić właściwe rozpoznanie. W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. nawracających wymiotów, wymiotów krwistych lub smolistych stolców) należy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć obecność zmian nowotworowych. Zaleca się także zasięgnięcie porady lekarza przed przyjęciem produktu Famotydyzna Ranigast przez następujących pacjentów: pacjenci w średnim wieku lub w podeszłym wieku z objawami niestrawności, które wystąpiły po raz pierwszy lub u których objawy te uległy zmianie w ostatnim czasie; pacjenci z trudnościami z przełykaniem, długotrwałym bólem brzucha lub niezamierzoną utratą masy ciała w połączeniu z objawami niestrawności. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 14 dniach leczenia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Famotydyzna wydalana jest głównie przez nerki, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Famotydyzna nie jest odpowiednia dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek pozostających bez opieki medycznej. Famotydyzna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu u dzieci nie zostały zbadane. Podczas podawania famotydyny pacjentom w podeszłym wieku w trakcie badań klinicznych nie obserwowano wzrostu częstości występowania lub zmiany rodzaju działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. Nie jest wymagana modyfikacja dawki tylko ze względu na wiek. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej produkt może powodować reakcje alergiczne.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Famotydyna Ranigast 20 mg x 20 tabl. powł.

Galeria



FAMOTYDYNA
Ranigast **LEK**

LEK POLECANEJ MARKI
NA ZGAGĘ I NIESTRAWNOŚĆ

FAMOTYDYNA Ranigast
to lek o kompleksowym i szerokim działaniu:

- ▶ ZGAGA
- ▶ NIESTRAWNOŚĆ
- ▶ NADKWAŚNOŚĆ

Badania kliniczne w ranidzie (2012/2013, 2014, 2015) z grupy ranidzie. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku.

FAMOTYDYNA
Ranigast **LEK**

JEDYNY TAKI LEK, KTÓRY
DZIAŁA SZYBKO I DŁUUUGO*

Działa aż do
12 godzin³

*Wskazywać, jak długo trwa działanie leku w porównaniu z innymi lekami w tej grupie. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku. Ranigast: marka nr 1. 10 mg i 20 mg w postaci tabletek powłokowych. Dane do 2015 roku.

FAMOTYDYNA
Ranigast **LEK**

MAŁA TABLETKA
zaledwie 6mm średnicy



Ranigast

MARKA NR 1
W ŚWIADOMOŚCI OSÓB
CIERPIĄCYCH NA ZGAGĘ⁴

#1

Konkrety – świadomość w kategorii zgaga. Q4 2017

Ranigast

POZNAJ INNE PRODUKTY
Z RODZINY RANIGAST

Ranigast SOS Mleczko,
wykazuje takie same działanie
jak tabletki

Ranigast SOS:
Zgaga i nadkwaśność

FAMOTYDYNA
Ranigast **LEK**

Famotydyna Ranigast
Skład i postać: Każda tabletkę powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancją pomocniczą o znanym działaniu: czerwień kosenilowa (E124).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zauważono nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie.
Niewydolność nerek: Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Powołanie na dopuszczenie do obrotu nr R/0147 wydane przez MZ, Lek wydawany bez recepty, 2020.12.22.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.