

Fervex, 8 saszetek

Cena: 21,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Fervex 12 to lek stosowany do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych u dzieci powyżej 15 roku życia, oraz dorosłych.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające przekrwienie i obrzęk błon śluzowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę.

Skład

1 saszетка zawiera:

- paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg, substancje pomocnicze: sacharoza (11,5 g), bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
- Jaskry z wąskim kątem przesączania.
- Rozrostu gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.

- Wiek poniżej 15 lat.
- Nietolerancji niektórych cukrów

Działania niepożądane

Fervex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta wystąpią. Poniżej przedstawiam możliwe działania niepożądane:

Ostry atak jaskry, który może objawiać się wysokim ciśnieniem w oku, bólem oka i zamgleniem widzenia (ryzyko większe u pacjentów ze skłonnością do jaskry).

- Zaburzenia oddawania moczu.
- Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia.
- Zaburzenia równowagi, pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w podeszłym wieku).
- Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
- Splątanie, omamy.
- Niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.
- Uspokojenie lub senność, szczególnie na początku leczenia.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, w tym również o lekach bez recepty. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu Fervexu z następującymi lekami:

- Pochodne morfiny,
- Neuroleptyki,
- Barbiturany,
- Benzodiazepiny,
- Leki przeciwłękowe inne niż benzodiazepiny,
- Leki nasenne,

Ostrzeżenia

- Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 5 dni.
- Leku nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol. U osób dorosłych (o masie ciała powyżej 50 kg) dawka dobową paracetamolu nie powinna przekraczać 4 gram.
- Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie spożywających alkohol.
- Łączne stosowanie alkoholu i środków uspokajających może nasilać działanie leków przeciwhistaminowych, stąd należy unikać ich przyjmowania.
- Każda saszetka jest źródłem sacharozy (11,5 g), osoby chore na cukrzyce powinny wziąć pod uwagę zawartość cukru w saszetce.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.